

Vandaag zijn er bij uw kind forsus-veren geplaatst. De forsus-veren zijn aan de bandjes in de bovenkaak en aan de boog van de slotjesbeugel in de onderkaak bevestigd.

Werking beugel

De veren worden gebruikt om de stand van de boven- en onderkaak ten opzichte van elkaar te verbeteren, door de aanwezige groei van de onderkaak te stimuleren en de groei van de bovenkaak iets te remmen. Hierdoor zal de afstand tussen de boven- en ondertanden (de overbeet) verkleind worden en zullen de kiezen mooier in elkaar passen.

De beugel zit vast in de mond en is dus 24 uur per dag werkzaam. Dit maakt de forsus-veren zeer effectief. Om deze reden worden de forsus-veren dan ook vaak gebruikt ter vervanging van elastieken. Om een stabiel resultaat te behalen, zullen de veren doorgaans zes tot negen maanden in de mond blijven.



Bijwerkingen

De eerste dagen na het plaatsen van de veren, kan spierpijn optreden in de wangen/kaken. Daarnaast kunnen de tong en kiezen in de onder- en bovenkaak gevoelig zijn. Eventueel kan paracetamol worden ingenomen, om ongemak te verminderen. Bij voorkeur kunt u uw kind zacht voedsel geven, totdat hij/zij aan de beugel gewend is.

Overige informatie

Om te voorkomen dat de veren los raken of beschadigen, dient de mond niet te ver geopend te worden. Daarnaast zal het zijwaarts bewegen van de onderkaak beperkt moeten worden. Vermijd hard en plakkerig voedsel om te voorkomen dat de beugel beschadigd of losraakt. Wanneer (een van) de forsus-veren los zit(ten), dan hebben wij vaak iets meer tijd nodig om dit te herstellen. In dit geval kunt u telefonisch contact opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen, of om de bestaande afspraak te verlengen.