

Vandaag heeft u/uw kind een lipbumper gekregen. Dit is een metalen stangetje dat voor de ondertanden langs loopt. Ter comfort is de lipbumper afgewerkt met een kunststofhars/siliconen laagje. In de meeste gevallen is een lipbumper zelf uitneembaar. Om de onderste kiezen zijn metalen bandjes/ringetjes geplaatst. Aan de buitenzijde van deze bandjes zitten buisjes, waar de lipbumper in geschoven kan worden.



Een lipbumper zorgt ervoor dat de grote kiezen in de onderkaak op hun plek blijven staan, of juist iets naar achteren gaan, waardoor ruimte wordt gemaakt in de onderste tandboog.

## Bijwerkingen

De eerste twee tot vier dagen na het plaatsen van de lipbumper worden eten en praten iets bemoeilijkt. De kiezen waaraan de lipbumper bevestigd wordt kunnen de eerste paar dagen gevoelig zijn. Ook kan de onderlip soms geïrriteerd raken. De klachten nemen na een aantal dagen af.

## Dragen van een lipbumper

Draag de lipbumper zo veel mogelijk. Bij eten en drinken mag de lipbumper ingehouden worden. Bij (contacts)sport of spel wordt aangeraden om de lipbumper uit te doen.

## Mondhygiëne

Neem de lipbumper altijd uit bij tandenpoetsen. Het is erg belangrijk dat de overgang van het tandvlees naar de bandjes goed schoongehouden wordt, door minstens tweemaal daags te poetsen met een handtandenborstel of elektrische tandenborstel.

## Overige informatie

Bij het plaatsen van de lipbumper heeft u/uw kind gipsmodellen meegekregen. Deze modellen zijn gebruikt om de lipbumper op maat te maken. **Bewaar deze modellen goed!** Indien een onderdeel van de lipbumper kapot is, kunt u telefonisch contact opnemen via 020-6434619. Wij zullen u waarschijnlijk vragen om de lipbumper en de gebitsmodellen af te geven, zodat wij de lipbumper kunnen opsturen ter reparatie. Indien de gebitsmodellen niet bewaard zijn, kunnen eventueel opnieuw afgedrukt worden.