


Vandaag heeft u/uw kind een TPA gekregen, een metalen stangetje dat onder het gehemelte langs loopt. Om de bovenste kiezen zijn metalen bandjes/ringetjes geplaatst. Aan de binnenzijde van deze bandjes zitten buisjes, waar de TPA aan bevestigd is. Daarnaast zijn elastiekjes of kleine ijzerdraadjes geplaatst om de TPA goed in de band vast te houden. Hierdoor is de TPA niet zelf uitneembaar.



Er zijn verschillende indicaties voor het plaatsen van een TPA. Zo kan de TPA gebruikt worden om de volwassen kiezen op hun plaats te houden, om de bovenste tandenrij licht te verbreden of ter retentie van de huidige breedte.

Bijwerkingen

De eerste twee tot vier dagen na het plaatsen van de TPA worden eten, praten en slikken iets bemoeilijkt. De kiezen waaraan de TPA bevestigd is kunnen de eerste paar dagen gevoelig zijn. Ook kan de tong soms geïrriteerd raken. De klachten nemen na een aantal dagen af.

Mondhygiëne

Het is erg belangrijk dat de overgang van het tandvlees naar de bandjes goed schoongehouden wordt, door minstens tweemaal daags te poetsen met een handtandenborstel of elektrische tandenborstel. Ook de ruimte tussen de TPA en het gehemelte moet dagelijks worden schoongemaakt. Hiervoor kan een ragertje en/of monddouche gebruikt worden.

Overige informatie

Indien een onderdeel van de TPA los is, kunt u telefonisch contact opnemen via 020-6434619.